

# DISSERTAZIONE SUL CHOLERA MORBUS DEL DOTTOR GOSSE

---

Louis André Gosse



**DISSERTAZIONE**

**SUL**

**CHOLERA MOREUS**

**DEL**

**DOTTOR GOSSE**



*scholaria*  
**DISSERTAZIONE**

5

SUL

**CHOLERA MORBUS**

DEL

**DOTTOR COSSE**


TRATTO DALLA BIBLIOTECA UNIVERSALE DELLE SCIENZE  
LETTERE ED ARTI

LIVRELLA NUM. 15 FONDATO MONSIEUR



**VENEZIA**

TIPOGRAFIA DI CORMONCINI & SANTU MARINI, N. 1408  
MDCCCXXII



## DISSERTAZIONE

SUL CHOLERA MORBUS DEL D.<sup>o</sup> GOSSE

*Il cholera-morbus, epidemia devastatrice dopo di essersi manifestato per la prima volta nell'Indie orientali, ed aver durato il successo dell'estate, si è esteso nella Russia donde minaccia d'invadere l'Europa occidentale. I ripari che gli furono opposti sinora per la più gran parte empirici, o fondati sopra procedimenti indotti, sono riusciti di poca efficacia, se non anche nocivi in qualche caso.*

*In tale incertezza è dovere di chiunque professa l'arte medica di giovare della propria esperienza per tentare di chiarire tale materia: e il sentimento di questo dovere guidò la mia penna ad estendere in fretta la seguente Dissertazione intorno al trattamento da usarsi pel cholera-morbus con alcune osservazioni prodotte sui suoi sintomi e le sue cause: le che fu da me fatto con tutta maggior confidenza quanto che le opinioni su cui si fonda la mia pratica ottengono il più fortunato successo nella Grecia in casi di epidemia analoghe di peste, di febbri perniciose con complicazione di cholera ed altre occasioni da curare nel 1804.*

*Ginevra 20 gennaio 1805.*

1

2

3

4

## SINTOMI.

**L** cholera-morbus è una malattia i cui caratteri sono uno spasmo di stomaco e d'intestini che provoca frequenti vomiti ed evacuazioni alvine con violento granchio alle gambe ed una prostrazione e stretta di forze. I vomiti sono sovente acidi e le deiezioni acri ed acquose. Il sangue abbandonando i vasi capillari della superficie esteriore del corpo si concentra all'interno nei grossi canali: il polso si fa esile ed anche innumabile, talvolta senza suscitare la sua frequenza spazialmente in sul principio; un freddo interno s'impadronisce di tutto il corpo, meno la regione dello stomaco ove il malato prova una specie di sensazione interna calorosa e bruciante; si abbassa la stessa temperatura del fuso; provasi sete inestinguibile, si altera spaventevolmente la facceria divenendone plumbea e giallastra la tinta, incrociati gli occhi, rapidissimo lo smagrimento della persona, mentre però le facoltà intellettuali mantengono nella loro integrità. Ove non vengono amministrati prontamente soccorsi, il malato sfinito dal dolore, dallo spasmo e dalle eccessive evacuazioni ben presto soccombe. Colto morbo attacca indistintamente tutti i sessi e

tutto l'at. In tali casi l'antepala non presenta per ordinario veruna traccia d'infiammazione propriamente detta; indica bensì la presenza di congestioni sanguigne passive; vi si scorgono delle ecchimosi nervate le quali sembrano annunciarne una tendenza estensiva dello stomaco e dell'intestino; incisa la vena il sangue non offre veruna traccia di estrema infiammatoria, ma n'oca come degenerato nella sua composizione: in una parola tutto prova le conseguenze funeste di una grave alterazione nel sistema nervoso. Tali sono i sintomi visibili del Cholera come si presenta tra noi sotto forma sporadica, vale a dire quando esso non fa che attaccare or questo ed or quell'individuo isolatamente, e che ha la sua origine da cause accidentali.

Ma il Cholera non è già solamente un morbo sporadico: esso si manifesta altresì sotto forma epidemica attaccando più individui nello stesso tempo e luogo, e si associa con altre malattie epidemiche e endemiche, nel qual caso assale specialmente le persone di debole costituzione, le donne, i fanciulli ed i vecchi. I suoi caratteri sistematici anche in questo caso sono all'incirca gli stessi di quelli del Cholera sporadico; se non che compariscono meno acuti, e fieri e proceduti ordinariamente da cefalgia pesante, abbattimento di membra, inarcano gastrico, febbre, voglia, languore generale, ec.

Finalmente il Cholera può non solamente essere epidemico ma divenir pur contagioso. Nelle Indie orientali esso manifestasi sotto coteste due forme 14 e 15 anni fa, e sotto lo stesso doppio carattere sembra essersi di cola propagato attraversando la Persia sino nella Russia, per quanto almeno si persuasero di giudicare le relazioni un po' vaghe che ne furono pubblicate sinora. In una memoria indiritta dal con-

sole di Odessa al ministro delle Relazioni estere di Francia si contengono delle indicazioni precise intorno la natura del sistema che caratterizzano siffatta epidemia contagiosa. Al pari di ogni altra epidemia essa presentava in Odessa differenti gradi d'intensità e un procedimento variatissimo secondo i diversi individui. In alcuni manifestavasi con un violento retore, con ripetute evacuazioni alvine e non grandi; in altri precedevano a questi gravi fenomeni «lumi sterminanti senza perturbazione delle facoltà mentali, oppressioni, sensazione dolorosa particolarmente alla regione del cuore, un generale malessere, calore addominale con bruciamenti, anarcosia e sete ardente, non che con coagulazione di ventre e febbre. Come accade a Tiflis considera lo vomito come il sintomo più pronunciato dell'esordio che fa l'epidemia del Cholera dominante sulle sponde del Caspio. Le sezioni cadaveriche eseguite nell'India del D. Alessandro Turnbull Christie hanno dato a vedere che nel maggior numero dei casi esistono per entro gl'intestini delle copiose serosità, e dei conglobamenti di sangue fibrinoso, talora in altri la membrana mucosa si delle stomaco che degli intestini si copre di una bianca sostanza viscosa aderente, che sembra del pari essere di natura albumino-fibrinosa. Scorgesi tracci di conglobamenti sanguigni ne' visceri addominali, non che di flagelli in alcune parti della mucosa spandente verso l'estremità pilorica dello stomaco e negli intestini sottili; la vescichetta biliare si riempie di bile verstra ec. ec. I muscoli poi si ammassano come avviene da chi è colpito di fulgore. Il sangue tratto dalla vena resta in massa compatta senza separazione di siero e coagula. Tali sembrano essere i caratteri del flagello che imperava nella Russia.

Il Cholera sporadico si dichiara in conseguenza di sofferse alterative di caldo e freddo, di abuso di bevande fredde ed acide, soprattutto nei climi equatoriali ove fresche notti succedono a calde giornate, nelle stagioni in cui la temperatura è elevata, in momenti in che le funzioni esterne sono fortemente eccitate, e abbondantemente si suda. L'assue di cibi indigesti, di frutta mucilaginosa, maderosa e specialmente acida produce lo stesso effetto. Nel numero delle cause predisponenti devonsi comprendere la fatica, la tristezza d'animo, la veglia, l'eccitamento cerebrale, i diversi eccessi del vino, nelle donne ed altre cause debilitanti il sistema nervoso. Quando il morbo si presenta sotto forma di epidemia acuta, alle cause suddette conviene aggiungere le particolari condizioni atmosferiche, i venti, l'elettricismo atmosferico, l'eccitamento pelagico ec. le quali cause agiscono come contrasollecitanti sul sistema nervoso. Ciò è provato dall'osservazione dei luoghi in cui sviluppanosi coteste epidemie, delle stagioni in cui esse si manifestano, della marcia che seguono e del loro termine. (V. l'opera intitolata *Des maladies rhumoides* p. 258 (1)) Il D. Christie cita il fatto di un'epidemia di Cholera nell'India, la quale dileguasi improvvisamente dopo un violento scoppio di tuona. L'epidemia di Persia non durava che circa sei settimane o due mesi, indi cessava tutto di colpo. La miseria, la mancanza di nutrimento ovvero di un nutrimento arduo, la poca nettezza, il soverchio accumularmento degli abitanti aumentano gli accidenti gravi e per conseguenza in-

(1) Va ved. in 2.<sup>a</sup> Classe 1841 - Roma il librigo Barbieri.

influenza sulla propagazione della malattia e la fa cangiar di carattere.

Fundamentale quando il Cholera-morbus epidemico si trasforma in contagioso, anche la malattia propagata per una causa atipica, per un vero veleno miasmatico, ch'esercita un'azione contrastante sul sistema nervoso; il qual veleno sviluppata con sintomi infiammatori posto a contatto coll'aria, e diffusa sotto forma di miasma, tenta di riprodurre la stessa malattia dappertutto ove ritrovi corpi disposti a riceverlo (V. la mia teoria del contagio miasmatico rheumatico p. 523). Questa mia opinione viene confermata dalla successione e dalla natura dei sintomi che caratterizzano l'epidemia semplice o contagiosa, non che dalla natura dei calcoli. Nel Cholera sporadico, ed anche semplicemente epidemico, i calcoli non presentano veruna specie di reazione infiammatoria, ma si ha delle congestioni sanguigne prodotte da primordiali accidenti nervosi, da corroni, da derivazioni diverse, fino a un acido o neutralizzante, che porta nell'epidemia del Cholera contagioso veggendosi comparire i calcoli di fibrina e le estese albuminose-fibrinose. Nel Cholera sporadico, i vomiti e le evacuazioni sono soprattutto per addizionale all'ingrossamento, mentre nell'epidemia tali accidenti spasmodici sono preceduti da sintomi generali indicanti un indebolimento ne' centri nervosi. Quando la malattia diventa contagiosa, di frequente i sintomi predominanti nel suo esordio sono vertigine, sordità, stordimento, zozzatura, i quali sintomi provocano l'azione contrastante del miasma contagioso sul centro nervoso cerebrale-quale, da una derivazione all'indietro quella stessa dell'epidemia post-dizionale di Megara, ove il principio contagioso della peste latente volatila col progresso dell'intensità del morbo,

non più propagarsi pel solo veicolo della pelle e pel contatto immediato, ma altresì pel mezzo dell'aglio e penetrando per le narici e la bocca, nelle cavità nasali e altre ne' polmoni, esso agiva direttamente sui nervi cerebrali che si distribuivano tra quelle località.

Al pari che intorno della febbre gialla, della febbre perniziosa e della peste d'Egitto, varie furono le opinioni dei medici rapporto alla natura contagiosa o no del cholera epidemico dell'Indo e della Russia. E' ciò è ben facile ad intendersi giacchè secondo le diverse circostanze siffatta malattia, siccome le altre citate antecedenentemente, può essere o no contagiosa, appoggiando in tal guisa la regola generale da me stabilita (V. Mal. ricorrent. p. 398, non che l'opera di J. Johnson *On the influence of tropical diseases* Londra 1848 p. 179, e 199). Del rimanente basta per noi ch'essa sia contagiosa in qualche caso per considerarla tale in generale, e per dispor quindi ad essa una parte del nostro modo di trattarla.

## TERAPEUTICA

### Trattamento nel Cholera Morbus.

#### METODO CURATIVO

1.<sup>a</sup> Lo spunto doloroso degl'intestini e dello stomaco, le sverolte defezioni alvine, non che l'esistenza di una congestione sanguigna alla testa, fa che debbiam considerer i narcotici come il rimedio principale di tal male, e particolarmente l'oppio e le diverse sue preparazioni, atteso la sua azione soporifera sugli intestini. Esso può somministrarsi in polvere, ovvero sotto forma di nitroa aquos ri-

ness ed alcoolica o spogliato del suoi principi inertì, allo stato di morfina, tanto solo che mescolato con bevande acquose, tepide, aromatiche (1). Le sue dosi dovranno esser forti e spesso ripetute (15 e ne goccie di laudano ed anche di più ad ogni quarto di ora) sin a che si riancorino i fenomeni. Se poi i vomiti fossero ostinati e lo stomaco non comportasse l'appio liscio, converrà combinarlo colla miscela del Riccio (certamente anche con succo citri q. S. ed amaro), colla polveri effervescenti (acidi citrici, ed tartarici cristall. e scrup. denar in chiara alb. B. carbon sod. e scrup. denar in chiara rubra. Solte separate con aqua fontana al syrope gomme arabici, nare misce) con aqua carica di acido carbonico (acqua di Seltz). Se l'irritamento dello stomaco non sia gran fatto considerevole, lo si unirà con liquidi amellaginosi, ovvero verrà amministrato per reinterre combinato con acido, guallo d'oro e qualche veicolo stitilaginoso (una clorazione di grano di Tine). Se poi sia grande l'irritamento dello stomaco converrà unirlo con liquidi amellaginosi, gommosi o albuminosi, e in tal caso si preferirà una soluzione dell'estratto acquoso d'appio, ovvero la morfina (acetata, e solita).

La buona riuscita di questa prima cura molto dipende dall'epoca in cui viene amministrata, e per regola generale tanto è più efficace l'influenza dei narcotici, e tanto men forte la dose che vi si richiede, quanto più prontamente vengono essi adoperati.

2.<sup>a</sup> *Mixt. e tere alcohol.* Fa d'uopo per l'ordinario di unirsi coi narcotici. La morfina (calcinata o carbonata) più di sovente si prende a com-

(1) Non si può bisognare per altro quest'ultima avvertenza da bella prima non somministrare il vomito.

cinque da caffè ed ogni quarto d'ora, la soda (bicarbonata e carbonata o una soluzione di soda caustica) e la potassa (liquor potassae) vengono del pari indicate secondo l'idiosincrasia dell'individuo o della sua suscettività. In mancanza di quest'ultimi, può adoperarsi pure l'acqua di calce (aq. calcis.) la crota lavata (carbonato di calce) sciolta di cagno (caust. caustor.). Finalmente nei casi di estrema debolezza dovranno preferirsi l'assottigliata liquida ovvero il carbonato di ammoniaca mischiato con liquidi mucilaginosi ed aromatici.

3.<sup>a</sup> Aromatica. Si apparecchia ordinariamente sotto forma di infusioni aquee tepide. La pianta della famiglia delle Labiate (la melissa, la menta e simili) somministrano le più gradite lavande, e che più dell'altre agiscono sulla pelle. Raggiungono però lo stesso scopo anche le infusioni di camomilla, anella, gerani, rose maritima, zinzaro, verdagiglio, anice ec. e tutti in generale gli oli essenziali aromatici.

4.<sup>a</sup> Mordicante, gelatinoso ec. Essi servono di veicolo o bilite sfimentare quando esiste una grande irritabilità nella membrana mucosa dello stomaco e degli intestini, ma in caso di cholera somministrandoli per bocca giova di toglier loro con l'aggiunta di qualche aroma l'insipida odore ch'è lor propria. I veicoli più economici e semplici sono le decussioni dei grani di lino o di semola; quella della grana rosata (*symplicissimum officinale*) ha il vantaggio di essere un leggero astringente. Nel nostro caso le lavande gelatinose o albuminose allungate sono preferibili a quelle gommate, le quali al pari dei liquidi zuccherosi prontamente ingrossano. Una delle più piacevoli ed utili bilite è quella composta di destilli d'ajo stemati in acqua pura, e aromatzata con

acqua distillata di anice, di fiori di arancio o di cannella. Formaremo pure la base dello *hervaeum* alimentare il brodo di vitello o pollo, e le gelatine di colla di pesce. (V. più sotto l'art. *Sistema dietetico*).

5.<sup>a</sup> *Eccitazioni cutanee.* Il disordine notevole che nel diabete perviene le funzioni della pelle, la mancanza di calore, la prima circolazione alla periferia, accennano quanto basta di quale importanza abbia ad essere nell'attiva circolazione cutanea sino da del principio unitamente al trattamento interno di cui abbiamo fatto parola. Nel numero degli agenti utili a tal fine noi raccogliamo i bagni caldi, quelli a vapore, le fomentazioni calde croniche (di polvere di strame) estese su tutto il corpo, le frizioni calde e l'applicazione alla regione dello stomaco di ventose, sanguisughe, acqua bollente, alcool infiammato, quelli vascolari istantanei ed economici.

6.<sup>a</sup> *Amari ed astringenti.* Quando si sono dilagati gli accidenti spasmodici, conviene ricorrere a sostanze capaci di ristabilire l'equilibrio nervoso o meglio di consolidare il suo ristabilimento e prevenire le recidive (V. *Med. chim.* p. 57). Quindi è che gli amari e gli astringenti combinati insieme con mucilagine di gomma ed aceto vi hanno una particolare influenza. La radice di Colombo è la prima indicata quale antemetico sotto forma d'infusione; tina dietro la china colle sue diverse preparazioni sempre però sotto forma di soluzione e combinata colle sostanze gommose. (Il soluto di china, l'infusione di china gialla polverizzata nell'acqua fredda dopo una previa triturazione colla magnesia calcinata ec.). Possono adoperarsi quali succedanei di questi amari esotici degli amari indigeni, siccome salice, cassia, scorza di salice, griseina, ec. Tra gli astringenti

genti si preferisce la corteccia di quercia, la radice di bistorta, la assarida, il ratto e simili.

6.° *Purganti*. Siffatte medicine devono adoperarsi in sul terminar della cura onde regolarizzare le funzioni del fegato e degl'intestini, ovvero per espellere delle ascessioni che si accumulavano nel passaggio degl'intestini le quali talvolta sono molto aspri. Allora conviene alternare i purganti cogli amari. Tra i primi l'ale di rino combinato colla linza di cardamomo sembra sopra ogni altra cosa esser riuscita utile nell'Indo. Si ricorre pure a' purganti amari come sono il rebarbaro, la colaguanthide &c.

NB. Il trattamento curativo di cui abbiamo tracciato il piano è destinato pegli adulti: trattandosi di fanciulli, i quali più spesso che non si pensa vengono attaccati dal diavolo morbus, cotesto trattamento abbisogna di parecchie modificazioni importanti. Difatti siccome la testa dei fanciulli diventa facilmente la sede di congestioni sanguigne mortali, così è controindicata per essi l'amministrazione a forti dosi dell'oppio e dei narcotici in generale, ed invece conviene usare sopra ogni altra cosa gli eccitanti caldi, quali sono le fermentazioni, i clauspiri, i bagni caldi e aromatici revivati con vino, ale &c. indi gli acidi o terre stoliche, i ciciteri gelatinosi, le bibite del poro gelatinose, ed albuminose aromatiche, e così leggermente oppiate, amministrate con prudenza; finalmente gli amari combinati coi mucilaginosi, i fermenti amari, quali i sciloppi di rebarbaro, e fiori di pomeo e simili.

## SISTEMA DIETETICO

S'intende benissimo che una dieta severa deve favorire l'azione dei proposti medicamenti. Ciò che

dove costituisce la sostanza sono i brodi di carne leggera, il riso ben cotto, le uova fresche scroppiate con zuppa, o battute crude e combinate con anacardo, cannella o roccia macchiate in polvere, le gelatine di colla di pesce o piedi di vitello coll'estratto di riso e simili.

Quando cominciano a riprimerarsi le funzioni dello stomaco, si passa all'uso della carne, dei piedi di vitello, della selvaggina e finalmente delle viandette più sacralenti, preferendo sempre la carne arrostita alla bollita, evitando i grassi, le salse, gli acidi, il frangipane e simili. Il latte di vacca, di capra o di asinella tagliato coll'acqua è utile nella convalescenza. Neppure il caffè nero è contraindicato in questo stadio della malattia; egli si associa utilmente coll'amministrazione degli aperi.

## TRATTAMENTO PRESERVATIVO

Per garantirsi dal cholera mortis sparadico convien tenersi in guardia contro le vicende atmosferiche improvvisi e contro il freddo a' piedi; per lo che si dovrà portare la flussella sulla pelle, e specialmente una larga fascia di lino intorno la cintura, non diletter mai nella notte i vestimenti caldi e portarli larghi e fluttranti, mutando spesso di arresi e di calatura quando sia bagnata, di pettinare de' bagni ai piedi brevi sì una ripetuta, calli ed eccitanti onde ristabilir prontamente in essi la traspirazione, tenendo pure attenti le scarpe una federa di lino o di pelo bianco, e simili. Quando il corpo si trovi riscaldato non si dovrà abusare di bevande fredde od acide, di sidro, limonate, vini acidi o in stato di fermentazione, nè acqua gelata e tocolida. Si si atterrà dal puri delle frutta acide e

mangiarne, quali i peperoni, i carciofi, la zucca, le patate, le albicocche, ec. nè i legumi ventosi, od almeno almeno non mangiar che con moderazione e conditi con aceto. Nuocono pure le frittate di frutte nel grasso, nell'olio o nel burro. Il pepe, la mostarda, lo zenzero, la cannella ec. sono aromati in tal circostanza vantaggiosissimi. Le nocchere e le preparazioni in cui esse s'introducono in copia, sviluppando facilmente delle agrose, devono prendersi moderatamente soprattutto quando sono combinate con corpi grassi. Di sovente sono uole le salse magre quando lo stomaco si trovi in uno stato di letargia e disposto ad agrosia. Il caffè ed il the freddi con poco o nulla di nocchero, somministrano in simile caso una felice piacevole al pari e salubre. Non dee haversi birra in soverchia quantità specialmente dopo il cibo, i liquori poi spiritosi, dovranno sempre venir mescolati con acqua: uno di quelli che nei paesi o nelle stagioni calde nei paesi il meglio fa l'anivetta (il Rolo dei Greci) allungato con acqua. Sarà opportuno inoltre di rilevare a quando a quando prima del pranzo a qualche preparazione ancora aromata, quale la conserva di ginocchio colla succa di semi anari, il vino anaro combinato colla soda e simili.

## TRATTAMENTO DEL CHOLERA EPIDEMICO

### *Trentesimo capitolo*

L'opinione da noi conchiudente esposta nel precedente del cholera epidemico e nel modo in che agiscono in tale circostanza le cause predisponenti e determinanti, fa di già presentire le differenze che dee presentarsi il trattamento di esso in confronto dell'al-

tre da noi indicate. E di fatti nel chiedere rapidamente gli accidenti spasmodici dello stomaco e degli intestini sono preceduti da altri sintomi, che indicano una più o meno grave lesione del cervello a sua dipendenza, facendo dilagare i quali previene lo sviluppo degli altri ed elevare se ne diminuisce di gran lunga l'intensità.

1.<sup>a</sup> *Emetici*. Ranodi usasi per lo scopo cui si proponghiamo, gli emetici merca la constatazione che imprimono alla midolla allungata ed al cervello mediante l'ottavo paio di nervi, esser fanno lo stato di languore in cui trovasi il sistema nervoso: essi liberano altresì dello spasmo, ripristinano il calore e facilitano la traspirazione (V. *Mal. rhum.* p. 34) ed io ne ottengo sensibili del pari che rapidi i buoni effetti.

Tra gli emetici deve preferirsi l'ipocistiana, e-gendo essa con minor forza sovra gl'intestini di quelle il faccia il vomito subito ed essendo un maggior diaforetico, devono prendersi da 24 a 30 grani divisi in 2 o 3 volte negli adulti. Il solfato di zinco (vitriolo bianco) è egualmente indicato in tal caso (in dose di 4, 6 o 10 grani) ed ha inoltre il vantaggio di essere di poco costo. Il vomitivo deve darsi per quanto è possibile di sera onde non turbare la naturale progressione del sonno e della veglia; se trattasi d'individuo delicato gli si farà prendere una tazza di acqua inteneribilmente prima d'amministrargli la medicina onde prevenire la contrattura dolorosa prodotta dallo stomaco vuoto; e si avrà cura egualmente di dividere il vomitivo in 2 o 3 dosi onde poter graduar la sua azione; quando poi caratteri il vomito convulso eccitelo meccanicamente col aiuto di copiose bibite tepide. Se dopo il primo emetico mantenga una difficoltà nella funzione cerebrale, variegata,

collegio lacerante *ec.*, si dovrà presidiare un secundo ed anche un terzo proporzionando le dosi giusta la diversa eccitabilità del malato. Per contrabbandare la congestione del sangue al capo in conseguenza del vomito si ricorrerà a' pediluvii irritanti, scapioni, applicazioni alla fronte di acqua fredda con aceto; sovente anche di ugnatto dietro gli orecchi e le tempie (1).

2.<sup>a</sup> *Diferetica*. Subito dopo che avrà operato il vomitivo si faciliterà la traspirazione che comincia merce bevande e medicine diaforetiche leggermente acide, per esempio con infusori aromatiche conferite allungatissime (la salvia, e i fiori di sambuco *ec.*) con l'aggiunta di alcune gocce di aceto, di acetato di ammoniaco liquido e simili. Nei casi di tosse si farà uso degli antispasmodici (*Kramer sinerata*, *puls. James* *anglic.*) *ec.* Finalmente per aumentare la diffusione alla periferia si adopreranno delle fomentazioni calde aromatiche, da bagni a vapore *ec.*

3.<sup>a</sup> *Amari anticonvulsivi*. Ottenuta che siasi l'azione diaforetica, che diminuiscono i sintomi cerebrali e l'irritamento dello stomaco sia divenuto o leggero o nullo, fa d'uopo occuparsi del ripristinamento dell'equilibrio nel sistema nervoso merco gli amari (V. il trattamento del cholera spandico).

4.<sup>a</sup> *Purgativi*. Esistente sintomi d'infiammazione peritonea o sembrino turbate le funzioni del fegato, se la lingua sia biancastra, si provi ancora, costipazioni di ventre o evacuazioni irregolari, è utile che all'uso del purgativi precedano gli amari, i quali però s'uso di potere che intossico essi che ne adoperarceli subito e nel principio come fu praticato (V. le memorie di

(1) *Desquignolles* tratta d'ammontare di stomaco si applicheranno le sangatte all'epigastro.

Cornud d'Orléans, *Gazette médicale de Paris* T. 1. n.° 50).

5.° Nel caso di visibile turbamento nelle funzioni del fegato è indicato l'uso degli acidi minerali, della soluzione di cloro, e del mercurio in forti dosi.

6.° Sanguiqua. Le sanguigue locali devono per massima preferirsi alle generali quando l'irritazione allo stomaco o alla testa sia moderata; nè si ricorrerà alle ultime se non nel caso in cui lesioni violente risultanti da irritazione infiammatoria o da congestione col farsi sovra qualche viscere importante, come il cervello, i polmoni, il cuore, il fegato o le altre minaccino distruggere i tessuti di questi organi o di sospendere le loro funzioni; quindi nel praticar la sanguiga generale si avrà in veduta il trattamento del fenomeno e non quello della sua causa; il qual fenomeno ovante si ripiglieranno di nuovo le medicine destinate ad agire direttamente sul sistema nervoso, o a produrre una rimbomba positiva. Con questo medesimo intendimento si avrà attenzione di non usar mai della sanguiga in genere senza impiegar simultaneamente gli eccitanti della pelle, e particolarmente le frizioni, i bagni, le fomentazioni e simili (1).

7.° Finalmente se malgrado un tal trattamento usato ne' fenomeni primordiali, si dichiarino vanti ed eruzioni sistole spasmodiche si avrà a procedere in quella guisa di cui si è detto pel *cholera sporadico* (V. di sopra). Torna quasi inutile l'aggiungere che si dovrebbe procedere allo stesso modo se nel corso dell'epidemia si presentassero dei casi in cui

(1) La buona riuscita del trattamento indicato per sanguiga ne i fenomeni primordiali del *cholera* ha per base l'azione che sovra impiega nel profuso e sanguigno, sempre in tal caso sarebbe dall'istante forte di luogo una medicina indigesta.

effetti, fenomeni si manifestassero da bel principio, e che non fosse chiamato il medico se non al secondo stadio del morbo.

## TRATTAMENTO PRESERVATIVO

Indipendentemente dalle precauzioni raccomandate per prevenire lo sviluppo del cholera sporadico, conviene sopra ogni altra cosa evitare gli eccessi di fatica, le voglie protratte, il fresco notturno, il dormire in luogo umido, lo sporti alle evaporazioni paludose specialmente la sera e il mattino, e finalmente il tener lontani il timore e la tristezza d'animo. Si abitueranno generalmente i luoghi elevati ed asciutti, si avrà cura di non dormire allo scoperto e colle finestre dischiusa e si farà ogni giorno del moto a piedi e a cavallo ec. L'uso discontinuo degli amari e degli aromatici come *profilattici* dell'epidemia è più positivamente indicato che non nel cholera sporadico.

*Trattamento del cholera epidemico e contagioso.*

## TRATTAMENTO CURATIVO

Quanto abbiamo detto rapporto alla terapeutica del cholera semplicemente epidemico si applica in generale anche al cholera epidemico e contagioso. Difetti i sintomi cerebrali che antecedono i fenomeni gastrici e intestinali benché determinati dall'azione controstimolante di un miasma morbigeno speciale, sono della natura stessa e tengono all'incirca lo stesso indumento di quelli del cholera semplicemente epidemico: la causa soltanto è venale più attiva, più mortifera, e i fenomeni nervosi più presto e più frequente avvegnati da gravi fenomeni infammatori e

cognitivi, richiedono un tempo più presto ed energico trattamento. Per questa ragione lo consiglierò volentieri a chiunque persona che trovasi esposta al pericolo di un'epidemia di cholera contagioso, specialmente nei paesi ove i soccorsi medici non sono subito e portati all'epoca del maggior impermentamento dell'epidemia, quando la temperatura è alta e subitanea e forti sono le alternazioni di caldo e di freddo, lo consiglierò, dico, e non attendere la venuta sovvenuta tutela del medico per cominciare il trattamento, ma aver sempre presso di sé alcuni rimedii principali, come ipocresima, carbonato d'ammoniac e magnesia, tintura d'opio collata di china o le soliere: questo poi all'acqua calda ed agli aromi cui trovansi dappertutto. Ammettasi però che la malattia diventi infiammatoria per effetto di qualche negligenza, e mancanza della cura opportuna, di un'energia ridotta, del calore forte del clima, della stagione e dell'intorno delle abitazioni. Che cosa è a farsi in tal caso? in allora convien seguire un trattamento antilogistico somigliante a quello che adoperei all'indaco, la cui efficacia viene confermata da parecchi medici inglesi; cioè a dire 1.<sup>a</sup> sanguigne locali ripetute all'epigastro o alla tempia e sanguigne in genere 2.<sup>a</sup> Fusa all'interno del calcestruzzo o delle pillole turche (coll. hyd. nigr.) combinate coll'opio e dosi ripetute ma frequentemente ripetute, e con frangioia all'esterno di unguenti mercuriali oppiati, per ottenere, se così può dirsi, al più presto possibile di mercurio il sistema sanguigno (1). Indipendentemente dall'azione antilogistica del mercurio, sembra che questo metallo goda inoltre di una proprietà impor-

(1) Nell'India orientale per esempio producono tale effetto, se ricorre alle sanguigne mercuriali.

ed

lento, quella cioè di distruggere alcuni castelli, e poi tenerli pure a dipanare le convulsioni ferite di un' epidemia.

Che se mi si dica essere di troppo esteso il trattamento da me proposto, ovvero di troppo dell' sua applicazione per poter aver posto in pratica nel caso di epidemia così estesa come quella di Russia, rispondo che quanto alla prima obbiezione è facile la sventarla bastando di sostituire a certi medicamenti costosi costosi dei succedanei indigeni. Quindi nella cura dei poveri all'ipocistano si sostituisce il vitriolo bianco o il tartaro stibato; l'oppio barchi qui sia caro, lo è però meno nella Russia in proporzione della maggior vicinanza del paese donde proviene: tra gli alopi la calce e la potassa ed anche la stessa magnesia sono egualizzate a portata dei poveri e dei ricchi. Rapparto agli aromati indigeni di poco costo avri l'anice, la salvia, la menta e simili. Abbonissimi sono le sostanze mucilaginosi; facile ed economica è l'estrazione della gelatina dalle ossa. Modi costanti della pelle da me suggeriti sono familiari alla classe dei poveri specialmente in Russia, come bagni a vapore, frizioni colla polvere di sarsaparilla, versate, acqua bollente od alcool infiammato ad uso di vasicatori ec. Avri parecchi amari ed astringenti indigeni molto energici ed efficaci: tali sono la corteccia di salice e le sue preparazioni, la gualivera, la cametella, l'acanto, i fiori di padale, la bistorta, la corteccia di quercia e simili. Alle sanguette che in certi paesi e stagioni sono rare possono surrogarsi le variare scarificazioni. Finalmente il reubarbaro, il vomico caustico e simili sono purganti facili a procurarsi nella Russia. Quanto poi alla 2.<sup>a</sup> obbiezione, non a dir vero è più speciosa. Tuttavia con un po' di abitudine e coll'ajuto di una scorta

sorveglianza inselica a me sembra che il trattamento metodico da me proposto possa farsi popolare senza grandi difficoltà (1). Forse anche con questa idea potrebbe riuscire di qualche utilità il pubblicare e diffondere una breve, scetpica e chiara istruzione, onde far conoscere al popolo le principali condizioni del trattamento. Siffatta misura avrebbe coll'opinione nei sinodi una ragionevole sicurezza, tenderebbe a distruggere una delle cause morali debilitanti, la più attiva nella produzione delle epidemie.

## TRATTAMENTO PRESERVATIVO

Le precauzioni che abbiamo accennate per prevenire lo sviluppo dell'epidemia semplice di cholera, divergono insufficienti quando si tratta di cholera contagioso. Il principio contagioso ossia il contagio del cholera che sembra più diffusibile che non è la peste d'Egitto, prende il più di sovente il carattere di epidemia; per conseguenza le providenze che richieggonsi per debellarlo devono essere la più energiche. Esse consistono 1.<sup>a</sup> nell'impedire che il principio contagioso non si sviluppi; 2.<sup>a</sup> nel diminuirlo la sua attività; 3.<sup>a</sup> nell'evitare che si comunichi; 4.<sup>a</sup> nel distruggerlo.

1.<sup>a</sup> Siccome una traletta sporadica o semplicemente epidemica può farsi contagiosa ed accidentali svelando l'esame da me fatto delle circostanze che producono una tal metamorfosi, potersi in generale impellere ad prevenire od arrestar prontamente i sintomi infiammatori, nel caso d'avvio che neppur il cholera forma parte eccezione alla regola. Per appo-

(1) Difetti i soli medicamenti che richiedano alcune precauzioni nel usare sono gli emetici e l'oppio.

ta ragione ha insistito sul trattamento da prima per talatore, indi regolatore sino dal primo periodo della malattia quando i sintomi non sono ancora se non nervosi e passeggeri; alla qual precauzione io devo di aver detto che l'epidemia della febbre perniciosa manifestarsi a Foros nel 1828 non sia divenuta contagiosa, com'era stata precedentemente e di aver ottenuta una piccola mortalità. Corriamo in secondo luogo per impedire che non si sviluppi il principio contagioso estere l'Unione di molti malati della stessa natura, e allo stesso grado di malattia, in uno stesso locale, sostituito ove questo sia angusto, caldo e mal ventilato. Di fatti oserei, che in conseguenza di tale unione, l'emanazione morbifiche che svolgersi dai corpi respirando sopra i malati, sviluppano gravi fenomeni, che formarsi per effetto di un principio contagioso. Questa osservazione fatta durante il tifo, la febbre perniciosa, e la peste sembrano potersi applicare egualmente al cholera.

2.<sup>a</sup> Dichiarato che siasi una volta il principio contagioso come possa diminuire l'intensità. A ciò atteso si fa d'uopo di esporre il malato ad un'aria rinnovata acciò dipendere il sistema nell'aria ed attenuare gli effetti coll'impedire ch'esso si concentri. Sul qual principio mi è riuscito di arrestare in capo a tre o 4 settimane l'epidemia pestilenziale a Tycho presso Megara col far che gli ammalati uscissero di casa, collocando ciascuno separatamente entro capanne di fogliami l'una dell'altra distinte per alcuni piedi. Perciò durante la bella stagione converrà porre gli ammalati di cholera sotto e tende od edifici chiusi sì ben da tela e fogliami onde aver pure il vantaggio di una continua aria rinnovata senz'aver di che temere dalle correnti aeree provenienti dalle porte e finestre. Costete tende od edifici saranno inoltre stabiliti fra-

ri delle città e borgate onde per quanto è possibile disperdere il fomite contagioso. Nell'inverno inoltre i malati saranno custoditi entro vesti saloni muniti di ventilatori, e in mancanza di locali di tal natura s'isoleranno i malati in camere separate. Per tutt' generale, quando l'epidemia del cholera minaccia una città od un paese, l'autorità governativa deve prima di tutto procedere a distendere per quanto è possibile sopra una vasta estensione di territorio le popolazioni di soverchio accumulate in una sola località, soprattutto ove si tratti di città di antica data, nei quartieri di mercanzie bassi e mal ventilati ove alloggia ordinariamente la classe povera agiata, dovendosi per coti dire decimar la popolazione, e far che alberghi fuori delle città. Deve poscia rigorosamente sorvegliare sulla nettezza e quindi moltiplicar i mezzi di ottenerla ad ogni costo anche nell'interno delle abitazioni. E deve inoltre faruire gratis e copiosamente all'intera popolazione i mezzi di preservazione e di guarigione, i medici e la medicina. Finalmente essa deve provvedere anticipatamente ne' luoghi minacciati dal morbo copiose vittuarie onde poter istituire le quarantene militari senza pericolo di carestia.

5.° Benchè la propagazione del cholera contagioso sia molto meno indipendente dal contatto che non lo è la peste d'Egitto, mi sembra per altro che il sistema delle quarantene abbia ad osservarsi e uniformarsi ovunque si dichiarerà l'epidemia, usando di tanto maggior rigore quanto più il carattere del morbo sarà contagioso e più calda ed umida la stagione; nè si perderà mai di vista che i vestiti, i drappi, specialmente la lana, le pelli, più soverchiamente ancora degli stessi corpi sono quelli che propagano il principio contagioso, essendosi osservato degli individui che diffondevano la malattia da una cit-

ta all'altra senza esserne egli stesso affetto. Quindi non si dovrà insistere per prolungare di troppo la quarantena quando le persone di cui si parla dopo essersi rimaste alcuni giorni senza veruna apparenza di morbo, ed essendosi spogliate de' loro vestiti, avranno fatto dei bagni caldi o sulfurei, e a vapore, ed opportuni lavori (per esempio con bicloruri) ma si dovrà bensì usar di tutto il rigore per la purificazione delle mercanzie. Su tale argomento non può prendersi a modello la Polizia dei Lazaretti del mediterraneo, giacchè simili stabilimenti formano più un soggetto di speculazione che non d'igiene. Ivi si disinfevano imperfettamente le sostanze sospette (come sarebbero balle di cotone e simili) mentre poi si adoperava uno scrupolo ridicolo quando si trattava di passeggeri e di animali i quali si porrebbero prontamente al riparo d'ogni sospetto anche i lavori disinfezzanti.

I medici e gl'infermieri degli ospitali, ovvero le persone che vengono chiamate a curare ed a soccorsi gli attaccati di cholera, avevano l'avvertenza di coprirsi la bocca e il naso con una maschera formata di fine gascia impregnata di liquidi propri a distruggere i miasmi. (F. Bédier, *traité de l'chol.* 1817 Se. et Arts. p. 57). I guardiani poi raddoppiavano le loro precauzioni al momento di notte gli ammalati e di visitare i vivi di notte; poichè allora le emanazioni tanto nel cholera come nella disenteria sono più a temere. Le vesti di taffetà lustrato che indossano i medici durante le visite, e dispongono al loro uscire, sono utili per impedire di cui rientrando in società dopo aver visitato gli ammalati non trasgano altrove il germe mortifero.

4.<sup>a</sup> La chimica moderna rese all'umanità immensi servizi ed ha conosciuto la natura del prin-

cipi contagiosi e i mezzi di distruggerli. Il cloro e le sue combinazioni, i bicloruri di soda e calce sono i più efficaci ed operosi tra tutti gli agenti disinfettanti. Tutto ciò che può esporti alla loro azione senza essere decomposto, vi si dovrà sottoporre sotto forma di fumigazione, lavari, bagni, immersioni, aspersioni ec., e si potrà parer stato ad un certo punto al cospetto del contagio col poter seco o nei suoi vestiti de' macchietti di bicloruri, lavarsi di tratto in tratto le mani nelle loro dissoluzioni, ovvero applicare ad intervalli alle ungue una boccattina contenente dei bicloruri. Finalmente si terranno nelle stanze dei malati, specialmente negli ospitali, vari ripieni di bicloruri in polvere o in dissoluzione in guisa di saturar l'atmosfera collo svolgimento del cloro.

Dopo il cloro vengono gli acidi stannici, le fumigazioni con l'acido stannico (fumigazioni di Guyton) con l'acido sulfurico (mercé le salfre combusto) poi gli acidi vegetali, l'acido acetico (aceto) l'acido carbonico (sacro di litrone) l'acqua carica di aceto di soda, di soffice, di potassa ec. L'operazione in un forno o stufa fortemente riscaldata, e allora libera per lungo pezzo, mena che si sono già praticati con buon esito, e che devono adoperarsi specialmente per quegli oggetti il cui calore o tessuto potrebbero venir attaccati dal cloro o dagli acidi, come sotto le lettere, tessuti colorati ec.

Quanto alle fumigazioni colto stacco di canale, come si pratica nei lazareti del mediterraneo, riscontra inefficaci e ingiungono le sostanze che vi si sottopongono.

Si approfitterà della stagione fredda per distruggere col mezzo del fuoco o purificare le sostanze e le abitazioni contaminate o sospette d'infezione. Se le a-

le

abitazioni sono di poco valore è meglio incendiarle,  
e lo stesso si faccia dei vestiti e degli arredi. S'im-  
biancheranno poi con calce, e lavoreremo con sele-  
zione di dare le abitazioni che si vorranno conser-  
vare.

1

2

3

4

5

6

7

8